

RMPサマリー（更新版）

2025/12/22現在

618製品（560成分）

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (Yコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
テクフィデラカプセル120mg、240mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190024M1028_1190024M2024.html	フマル酸ジメ チル	バイオジェン・ ジャパン (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190024M1028 1190024M2024	多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	2023/11/24 初回作成 2017/01/27	IR	進行性多巣性白質脳症（PML） 白血球およびリンパ球数減少 PML 以外の感染症 急性腎不全 肝機能障害 アナフィラキシー 潮紅 消化器症状（下痢、悪心等）	● ● ● ● ● ●
ナルティンクOD錠75mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190035F1027.html	リメゲバント 硫酸塩水和 物	ファイザー (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190035F1027	片頭痛発作の急性期治療及び発症抑制	2025/12/16 初回作成 2025/09/29	IR MI	過敏症 妊婦における安全性 心血管系事象	●
ボルズイ錠2.5mg、5mg、10mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190034F1022_1190034F2029_1190034F3025.html	ボルルキサ ント水和物	大正製薬 (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190034F1022 1190034F2029 1190034F3025	不眠症	2025/11/27 初回作成 2025/09/01	IR PR	傾眠 ナルコレプシー症状 睡眠時麻痺 睡眠時随伴症 自殺念慮及び自殺行動 乱用の可能性	
メラトベル顆粒小児用0.2%、 メラトベル錠小児用1mg、2mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190028D1026_1190028F1027_1190028F2023.html	メラトニン	ノーベルファ ーマ（株）	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190028D1026 1190028F1027 1190028F2023	小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善	2025/07/18 初回作成 2020/04/08	IR PR	治療中止後の神経発達症に伴う諸症状の悪化や睡眠障害の悪化 傾眠 性成熟/発達遅延（思春期遅発）	
ラジカット注30mg、 ラジカット点滴静注バッグ30mg、 ラジカット内用懸濁液2.1%	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190401A1023_1190401G1026_1190032S1021.html	日局エガラ ン	田辺ファーマ (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190401A1023 1190401G1026 1190032S1021	【ラジカット注30mg、ラジカット点滴静注バッグ30mg】 1.脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善 2.筋萎縮性側索硬化症(ALS) における機能障害の進行抑制 【ラジカット内用懸濁液2.1%】 筋萎縮性側索硬化症(ALS) における機能障害の進行抑制	2025/12/01 初回作成 2015/07/31	IR PR MI	腎機能障害（急性腎不全・ネフローゼ症候群） 肝機能障害（劇症肝炎等の重篤な肝炎・肝機能障害・黄疸） 血小板減少・顆粒球減少 播種性血管内凝固症候群（D I C） 急性肺障害 横紋筋融解症 ショック・アナフィラキシー	● ● ● ● ● ●
レイボール錠50mg、100mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190030F1024_1190030F2020.html	ラスミタンコ ハク酸塩	日本イーライ リリー（株）	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190030F1024 1190030F2020	片頭痛	2025/12/08 初回作成 2022/03/01	IR PR MI	傾眠、めまい等の中枢神経症状 セロトニン症候群 薬剤の乱用 妊婦における使用	●
レケンピ点滴静注200mg、500mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190408A1025_1190408A2021.html	レカナマブ （遺伝子組 換え）	エーザイ (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190408A1025 1190408A2021	アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制	2025/07/11 初回作成 2023/12/15	IR MI	ARIA-E ARIA-H（脳微小出血、脳表へモジデリン沈着症、脳内出血） Infusion reaction 抗凝固薬併用患者での使用 長期投与	● ● ●
ロゼバラミン筋注用25mg	http://www.sanofi-japan.com/meds/1190410E1024.html	メコバラミン	エーザイ (株)	中枢神経系 用薬	11	その他の中 枢神経系用 剤	119	1190410E1024	筋萎縮性側索硬化症（ALS） における機能障害の進行抑制	2025/10/01 初回作成 2024/09/30	IR	アナフィラキシー	●
ゼオマイン筋注用50単位、100単位、200単位、 ゼオマイン注用50単位、100単位、200単位	http://www.sanofi-japan.com/meds/1229407E1029_1229407E2025_1229407E3021_1229407D1023_1229407D2020_1229407D3026.html	インコボツリス トキシンA	帝人ファーマ (株)	末梢神経系 用薬	12	骨格筋弛緩 剤/その他の 末梢神経系 用薬	122/129	1229407E1029 1229407E2025 1229407E3021 1229407D1023 1229407D2020 1229407D3026	上肢痙縮、下肢痙縮、慢性流涎	2025/12/24 初回作成 2020/07/15	IR PR	遠隔筋への影響 神経筋障害を有する患者への投与 過敏症反応 嚥下障害・誤嚥性肺炎（慢性流涎適応） 中和抗体の産生 筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用 他のボツリス毒素製剤を同時又は数ヵ月間隔で投与したときの相互 作用 痙攣発作（上肢痙縮、下肢痙縮適応） 転倒（下肢痙縮適応）	● ● ●
ボトックス注用50単位、100単位 （ボトックスピスタと同成分）	http://www.sanofi-japan.com/meds/1229404D1020_1229404D2026.html	A型ボツリス 毒素	グラクソ・スミ スクライン (株)	末梢神経系 用薬/泌尿 生殖器官及 び肛門用薬	12/25	骨格筋弛緩 剤/その他の 泌尿生殖器 官及び肛門 用薬	122/259	1229404D1020 1229404D2026	眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙攣性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、重度の原発性腋窩多汗症、斜視、痙攣性 発声障害、既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び 切迫性尿失禁、既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない神経因性膀胱による尿失禁	2025/05/16 初回作成 2015/06/17	IR PR	過敏症反応 神経筋障害を有する患者への投与 中和抗体の産生 痙攣性斜頸及び痙攣性発声障害における嚥下障害 遠隔筋への影響 眼障害 痙攣発作 過活動膀胱及び神経因性膀胱における尿路感染 過活動膀胱及び神経因性膀胱における尿閉 筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用 他のボツリス毒素製剤を同時又は数ヵ月間隔で投与したときの相互 作用 過活動膀胱及び神経因性膀胱における腎盂腎炎及び尿路性敗血 症 転倒	● ● ● ● ● ● ●
ボトックスピスタ注用50単位 （ボトックスと同成分）	http://www.sanofi-japan.com/meds/1229404AD1026.html	A型ボツリス 毒素	アヅビ合同 会社	末梢神経系 用薬	12	骨格筋弛緩 剤	122	122940AD1026	65 歳未満の成人における眉間又は目尻の表情皺	2025/06/26 初回作成 2016/05/19	IR	過敏症反応（ショック、アナフィラキシー、血清病を含む） 眼障害 中和抗体の産生 神経筋障害を有する患者への投与 遠隔筋への影響 痙攣発作	● ● ● ●
アボハイドローション20%	http://www.sanofi-japan.com/meds/1259702Q1026.html	オキシブチニ ン塩酸塩	久光製薬 (株)	末梢神経系 用薬	12	発汗剤、止 汗剤	125	1259702Q1026	原発性手掌多汗症	2024/01/30 初回作成 2023/03/27	IR PR	抗コリン作用に基づく副作用（霧視、尿閉、麻痺性イレウス等） 血小板減少	● ●
エクログゲル5%	http://www.sanofi-japan.com/meds/1259700Q1027.html	ソフビロニウム 臭化物	科研製薬 (株)	末梢神経系 用薬	12	発汗剤、止 汗剤	125	1259700Q1027	原発性腋窩多汗症	2025/03/06 初回作成 2020/09/28	PR	全身性の抗コリン作用（散瞳、緑内障、傾眠、めまい、排尿障害 等）	

製品名	URL	成分名	製造販売 業者名	薬効分類 (中分類)	薬効分類用 コード (中分類)	薬効分類 (小分類)	薬効分類用 コード (小分類)	販売名コード (YJコード) 12ケタ	効能又は効果	作成 年月日	SS	安全性検討事項 (IR,PR,MI)	リスク最小化活動 (通常：添付文書の記載)
													重大副
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「BMSH」 (レブラミドと同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/2025/06/25/initial/2023/10/24/	レナリドミド水 和物	プリストル・マ イヤー・ズ・ス カイ・ブ販売 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2039 4291024M1032	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/06/25 初回作成 2023/10/24	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「F」 (レナリドミド「サワイ」、レナリドミド「FNK」、レナリドミ ド「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/2025/08/13/initial/2023/09/14/	レナリドミド	富士製薬工 業（株）	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2047 4291024M1040	・多発性骨髄腫 ・5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/08/13 初回作成 2023/09/14	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	
レナリドミドカプセル2.5mg、5mg「FNK」 (レナリドミド「F」、レナリドミド「サワイ」、レナリドミド 「トーフ」と同成分)	https://www.medicines.or.jp/meds/2025/10/16/initial/2025/02/27/	レナリドミド	藤本製薬 (株)	腫瘍用薬	42	その他の腫 瘍用薬	429	4291024M2071 4291024M1075	【レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 【レナリドミドカプセル5mg「FNK」】 （1）多発性骨髄腫 （2）5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2025/10/16 初回作成 2025/02/27	IR	催奇形性	●
												骨髄抑制	●
												出血	●
												感染症	●
												血栓塞栓症	●
												過敏症（皮膚反応を含む）	●
												腫瘍崩壊症候群	●
												末梢性ニューロパチー	●
												虚血性心疾患	●
												心不全	●
												不整脈	●
												腎不全	●
												間質性肺疾患	●
												肝障害	●
												甲状腺機能低下症	●
												消化管穿孔	●
												起立性低血圧	●
												痙攣	●
												傾眠・錯乱・疲労・めまい・霧視	
												二次発がん	
												臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者への使用	
											PR	白内障	

